

エゾシカによる天然林への影響評価【2015 (H27) 年】

北海道・北海道森林管理局・北海道立総合研究機構

概要

エゾシカが森林に及ぼす影響は、人工林では調査対象を若齢林、高齢林などに限定すれば被害を評価しやすいものの、天然林は樹種や林齢等の構造が多様で面積も広大なため、評価が難しくなります。

天然林の広域的な調査には、多くの関係者が簡便かつ客観的に評価できる手法が望ましいことから、簡易なチェックシートを用いた調査を実施し、その結果をもとに北海道の天然林におけるエゾシカの影響を推定しました。

経緯

北海道森林管理局では、平成22年度から北海道内の国有林において、簡易チェックシートを用いたエゾシカによる天然林への影響評価手法について検討してきました。評価手法がおおむね確立されたことから、民有林でもこの手法を導入するため、国有林と民有林が連携した合同研修会を開催し、平成26年度からは国有林、民有林共に同じ手法で調査を実施して評価を行っています。

調査内容

平成27年度は、天然林における調査結果1,949件（調査機関：北海道森林管理局、北海道水産林務部、北海道立総合研究機構）を北海道立総合研究機構林業試験場がとりまとめ、データを点数化して、地理情報システムを用いて地図化しました^注。

簡易チェックシートの主な項目は、樹木の枝葉やササの食痕の有無、幹の角こすりや食痕の有無、調査地周辺における足跡やシカ道、糞などの痕跡の有無です。エゾシカの痕跡がない場合は0点、すべての食痕や痕跡などがみられた場合は100点となります。

調査結果

予測スコアは周囲の調査地点のスコアから算出したもので、調査地点からの距離以外の条件（地形や植生など）は考慮されていませんが、おおむね全道の森林におけるエゾシカの影響が示されています。黄～赤の地域では、下層植生の衰退など強い影響が生じており、緑の地域でも後継樹の減少が生じていると考えられます。

前年度の調査結果よりも強い影響を示す点が多くなっていますが、これは評価を担当する職員がエゾシカの痕跡を識別する技術の向上によるものと考えています。

今後はこれらの情報をエゾシカ捕獲などの被害対策に活用するほか、調査を継続して実施し、森林への影響をモニタリングしていきます。

注) 点数化及び地図化については、下記の文献をご覧ください。

明石信廣 (2015) 天然林におけるエゾシカの影響を簡易に評価する. 光珠内季報176号.
<http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fri/kanko/kiho/pdf/176-2.pdf>

簡易チエックシートによる天然林へのエゾシカの影響評価
(2015年)

