

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく化学合成農薬【節減対象農薬】の慣行レベル

最終更新日：令和6年3月29日

(単位：回)

| 類別 | 作物名 | 作型 | 化学合成農薬【節減対象農薬】の成分使用回数 |
|----------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 水稲 | 水稲 | うるち(移植) | 22(18) |
| | | うるち(直播) | 22(16) |
| | | もち(移植) | 21(17) |
| 麦類 | 秋まき小麦 | 秋まき | 15(14) |
| | 春まき小麦 | 普通まき | 12(10) |
| | | 初冬まき | 11(9) |
| | ライ麦 | 秋まき | 11(10) |
| 六条大麦 | 秋まき | 12(11) | |
| 豆類 | 大豆 | 露地 | 13(11) |
| | 小豆 | 露地 | 14(12) |
| | 菜豆 | 高級菜豆 | 11(8) |
| | | 手亡類 | 15(12) |
| その他畑作物 | ばれいしょ | ベタがけ・7月どり | 8(6) |
| | | 露地・普通栽培 | 21(18) |
| | そば | 露地 | 1(1) |
| | てんさい | 露地(移植) | 20(18) |
| | | 露地(直播) | 22(19) |
| | なたね | 露地 | 8(8) |
| | ひまわり | 露地 | 3(3) |
| | 子実用トウモロコシ | 露地 | 14(11) |
| 果菜類 | トマト | 加温越冬 | 39(39) |
| | | 促成・半促成 | 21(20) |
| | | ハウス長期どり・夏秋どり | 24(23) |
| | | ハウス抑制 | 22(21) |
| | ミニトマト | ハウス長期どり・夏秋どり | 23(22) |
| | きゅうり | 促成・半促成 | 40(40) |
| | | ハウス長期どり・夏秋どり | 33(33) |
| | | ハウス抑制 | 49(49) |
| | なす | トンネル・露地 | 12(12) |
| | かぼちゃ | 露地 | 8(6) |
| | | 露地・長期どり | 12(10) |
| | ズッキーニ | 露地 | 8(8) |
| | えだまめ | 露地 | 13(11) |
| | スイートコーン | 半促成・トンネル・露地7月どり | 8(5) |
| | | 露地8、9月どり | 12(9) |
| | さやいんげん | 半促成 | 7(6) |
| | | 露地・抑制 | 9(8) |
| さやえんどう | 露地・春まき(収穫期間1か月) | 12(11) | |
| スナップエンドウ | 露地 | 19(19) | |
| ししとう | ハウス栽培 | 13(12) | |
| とうがらし | ハウス栽培 | 10(10) | |
| 実えんどう | 露地・春まき | 11(9) | |
| 葉茎菜類 | たまねぎ | 春まき・早生品種 | 28(27) |
| | | 春まき・中、晩生品種 | 30(29) |
| | | 秋まき | 5(4) |
| | ねぎ | 簡易軟白・春夏どり | 14(11) |
| | | 簡易軟白・秋冬どり | 14(11) |
| | | ねぎ・ハウス早春まき | 16(13) |
| | | ねぎ・夏秋どり | 19(16) |
| | 小ねぎ | ハウス・露地 | 11(10) |
| | はくさい | ハウス早春まき | 7(5) |
| | | トンネル早春まき | 11(8) |
| | | 露地・晩春、夏どり | 17(15) |
| | | 露地・秋どり | 17(15) |
| | キャベツ | ハウス・トンネル | 5(2) |
| | | 6・7月どり | 16(13) |
| | | 8月どり | 17(14) |
| | | 夏秋どり | 19(16) |
| | ほうれんそう | ハウス春どり、雨よけ(6月どり) | 10(7) |
| | | 雨よけ(7、8月どり) | 9(6) |
| | | 雨よけ(9月どり) | 8(5) |
| | | ハウス(10~12月どり) | 9(6) |
| | | ハウス越冬 | 9(6) |
| | | 露地 | 10(7) |
| | チコリ | 露地 | 0 |
| サンチュ | ハウス栽培 | 0 | |
| モロヘイヤ | 半促成 | 2(2) | |
| にんにく | 露地 | 21(19) | |
| みつば | 軟化みつば | 16(15) | |
| しゅんぎく | 抜き取り | 6(6) | |
| | 摘み取り | 8(8) | |

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく化学合成農薬【節減対象農薬】の慣行レベル

最終更新日：令和6年3月29日

(単位：回)

| 類別 | 作物名 | 作型 | 化学合成農薬 【節減対象農薬】 の成分使用回数 |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 葉茎菜類 | みずな | ハウス春どり | 10 (9) |
| | | ハウス夏どり | 10 (9) |
| | | ハウス秋どり | 10 (9) |
| | こまつな | ハウス (4、5月どり) | 6 (4) |
| | | ハウス6月どり | 6 (4) |
| | | ハウス7～9月どり | 6 (4) |
| | | ハウス10月どり | 6 (4) |
| | チンゲンサイ | 露地・トンネル | 7 (5) |
| | | ハウス春どり | 8 (7) |
| | | ハウス夏どり | 10 (9) |
| | | ハウス秋どり | 10 (9) |
| | ターサイ | 露地 | 13 (12) |
| | | ハウス春どり | 12 (11) |
| | | ハウス・露地夏どり | 18 (17) |
| あさつき | ハウス・露地秋どり | 18 (17) | |
| | ハウス | 6 (6) | |
| にら | ハウス | 17 (17) | |
| | ハウス収穫2年目 | 20 (20) | |
| 食用ゆり | 露地 | 30 (29) | |
| 根菜類 | だいこん | ハウス・トンネル | 14 (12) |
| | | 露地・春まき | 12 (10) |
| | | 露地・夏まき | 15 (13) |
| | にんじん | 春まき (トンネル、露地) | 9 (7) |
| | | 春夏まき | 10 (8) |
| | ごぼう | 露地 | 8 (8) |
| | かぶ | ハウス・トンネル | 7 (4) |
| | はつかだいこん | 露地春まき、夏まき | 11 (8) |
| | ながいも | ハウス栽培 | 8 (7) |
| | ヤーコン | 露地 | 10 (8) |
| わさびだいこん | 露地 | 0 (0) | |
| わさびだいこん | 露地 | 11 (11) | |
| さつまいも | 露地早熟 | 10 (10) | |
| 果実の野菜 | すいか | 半促成 | 12 (10) |
| | | トンネル | 15 (13) |
| | メロン | 促成・半促成 (7月どり) | 14 (12) |
| | | トンネル (8月どり) | 16 (14) |
| | まくわうり | 抑制 (9、10月どり) | 17 (15) |
| | | 半促成 | 13 (11) |
| | | 露地 | 16 (14) |
| いちご | 促成 | 30 (30) | |
| | 半促成 | 18 (18) | |
| | トンネル・露地 | 14 (14) | |
| 洋菜類 | ピーマン | 夏秋どり (ハウス)・秋定植 | 34 (34) |
| | | 夏秋どり (ハウス)・春定植 | 23 (23) |
| | カラーピーマン (パプリカ) | ハウス | 15 (15) |
| | | 露地 | 12 (12) |
| | レタス | ハウス | 18 (18) |
| | | ハウス・トンネル・露地6月どり | 5 (5) |
| | | 露地7・8月どり | 8 (8) |
| | リーフレタス | 露地9月どり | 9 (9) |
| | | ハウス春どり | 6 (5) |
| | | ハウス・露地夏どり | 10 (9) |
| | サラダナ | ハウス・露地秋どり | 10 (9) |
| | | ハウス春どり | 9 (9) |
| | | ハウス・露地夏どり | 14 (14) |
| | セルリー | ハウス・露地秋どり | 14 (14) |
| ハウス促成 | | 14 (14) | |
| トンネル・露地 | | 15 (15) | |
| ブロッコリー | ハウス抑制 | 20 (20) | |
| | 露地6月どり | 8 (7) | |
| | 露地7月どり | 10 (9) | |
| | 露地8月どり | 13 (12) | |
| | 露地9月どり | 13 (12) | |
| アスパラガス | 露地10月どり | 10 (9) | |
| | ハウス・トンネル・露地 | 11 (-) | |
| | 立茎ハウス | 16 (-) | |
| 洋菜類 | 立茎露地 | 15 (-) | |
| | パセリ | ハウス | 7 (6) |
| カリフラワー | ハウス | 7 (6) | |
| | 早春まきトンネル | 5 (4) | |
| | 春夏まき | 12 (11) | |

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく化学合成農薬【節減対象農薬】の慣行レベル

最終更新日：令和6年3月29日

(単位：回)

| 類別 | 作物名 | 作型 | 化学合成農薬【節減対象農薬】の成分使用回数 |
|-------|--------|--------------|-----------------------|
| 果樹 | りんご | 中生種 | 31 (-) |
| | | 晩生種 | 31 (-) |
| | なし | 日本種 | 21 (-) |
| | | 西洋種 | 22 (-) |
| | ぶどう | 生食用・ハウス栽培 | 22 (-) |
| | | 生食用・露地栽培 | 24 (-) |
| | | 醸造用 | 17 (-) |
| | おうとう | 露地 | 20 (-) |
| | ブルーベリー | 露地 (早生～中生品種) | 24 (-) |
| | | 露地 (中生～晩生品種) | 28 (-) |
| ハスカップ | 露地 | 4 (-) | |
| | ブルーベリー | 露地 | 3 (-) |
| 薬用作物 | トリカブト | 露地 | 7 (7) |
| | トウキ | 露地 | 17 (17) |

(参考)

| 類別 | 作物名 | 作型 | 化学合成農薬【節減対象農薬】の成分使用回数 | |
|------------|------------|--------------|-----------------------|--------|
| 飼料作物 | 飼料用トウモロコシ | 露地 | 4 (-) | |
| | 子実用トウモロコシ | 露地 | 4 (-) | |
| 花き | カーネーション | 秋切り | 37 (-) | |
| | | 7～10月切り | 37 (-) | |
| | スターチス (宿根) | 夏秋切り | 41 (-) | |
| | キク | ハウス8月切り | 34 (-) | |
| | | ハウス9月切り | 40 (-) | |
| | 宿根カスミソウ | 新苗8～10月切り | 30 (-) | |
| | | 越年株春夏切り | 30 (-) | |
| | アルストロメリア | 周年 (定植年) | 62 (-) | |
| | | 周年 (定植2年目) | 76 (-) | |
| | ユリ | 9月切り | 25 (-) | |
| | トルコギキョウ | 夏秋切り | 18 (-) | |
| | デルフィニウム | エラータム | 4月まき無加温7～10月切り | 34 (-) |
| | | | 夏定植秋1回切り | 26 (-) |
| | | ペラドンナ | 無加温・3回切り | 38 (-) |
| | | | 夏定植秋1回切り | 26 (-) |
| シネンシス | | 2回切り (7月、9月) | 49 (-) | |
| かぼちゃ (観賞用) | 露地 | 8 (7) | | |

注1) 化学合成農薬の成分使用回数には、殺菌剤、殺虫剤、除草剤、植物成長調整剤を含む。

注2) 購入種子・種苗に使用されている薬剤についてもカウントの対象とする。

ただし、() 書きは化学合成農薬不使用の種子・苗等の入手が困難な場合の、種子・苗等に係る化学合成農薬の成分使用回数を除いた成分使用回数

注3) 作型については、「【参考】「化学合成農薬の慣行レベル」の作型に係る作期について」を参考のこと。

注4) 慣行レベルは、北海道内の各地域で行われている慣行的な化学合成農薬の使用状況をいう。

注5) 参考表は、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」適用の範囲である農産物でないため、ガイドラインの適用外である品目について、北海道慣行レベルを策定するもの。飼料作物は「北海道が定める「飼料作物」の慣行レベル」(平成27年3月23日付け食政第934号北海道農政部長の安全推進監通知)から、花きは「北海道が定める「花き」の慣行レベル」(平成19年4月10日付け食政第52号北海道農政部長通知)から転記。