

牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しについて




■ 牛海綿状脳症 (BSE) とは

○BSEは牛の病気の一つです。
「BSEプリオン」と呼ばれる病原体が、主に脳に蓄積し、脳の組織がスポンジ状になり、異常行動、運動失調などを示し、死亡すると考えられています。

【感染経路】

○この病気が牛の間で広まったのは、BSE感染牛を原料とした肉骨粉を飼料として使ったことが原因と考えられています。



○BSEに感染した牛では、BSEプリオンが、牛の脳・せき髄・回腸などに蓄積します。

【人への影響】

○1995年に、英国で変異型クロイツフェルト・ヤコブ病 (vCJD) 患者が初めて確認されました。vCJDはBSEとの関連性が示唆されています。




■ 特定危険部位（SRM：Specified Risk Material）

- 異常プリオンたん白質は、脳、せき髄、小腸などに蓄積し、これらの器官は特定危険部位（SRM）と呼ばれる。
- SRMの除去は、ヒトがvCJDに感染するリスクを低減するために重要な対策

< BSE発症牛のプリオンの体内分布及びSRM部位 >

出典：欧州食品安全機関「牛由来製品の残存BSEリスクに関する定量的評価レポート（2004年）」



■ BSE対策の経緯

	国内			輸入	
	検査対象	SRM除去	その他の動き	米国・カナダ	ヨーロッパ
H 8. 3 H12. 12					英国産：禁止 EU産：禁止
H13. 9	国内で1頭目のBSE感染牛確認				
H13. 10	全頭検査	・除去・焼却義務づけ -頭部 (舌・頬肉以外) -せき髄 -扁桃 -回腸遠位部 ・せき柱も使用禁止	・肉骨粉飼料完全禁止 ・牛海綿状脳症対策特別措置法の公布		
H14. 6					
H15. 5 H15. 12					カナダ産：禁止 米国産：禁止
H16. 2					
H17. 8 H17. 12	21か月齢以上			20か月齢以下 輸入再開 ※H18.1～7 混載事例発生のため 米国産の輸入 手続停止	
H21. 4 H21. 5			・ピッシング禁止 ・OIE総会で「管理されたリスクの国」と認定		



■ 飼料規制

肉骨粉を牛やその他の家畜に与えることを禁止する飼料規制は、評価対象の5か国で1997年までに導入され、その後、段階的に強化。

		給与飼料					
		日本 🇯🇵		米国・カナダ 🇺🇸 🇨🇦		EU (オランダ・フランス) 🇳🇱 🇫🇷	
		牛	豚・鶏	牛	豚・鶏	牛	豚・鶏
肉骨粉	牛	×	×	×	○	×	×
	SRM (注1)	×	×	×	○→× (注2)	×	×
	豚	×	○	○	○	×	×
	鶏	×	○	○	○	×	×


(注1) 米国では、30か月齢以上の牛の脳及びせき髄

○：使用可、×：使用不可

(注2) 米国及びカナダが、1997年に開始した飼料規制においては、牛のSRMの豚・鶏に対する飼料への利用が認められていたが、カナダでは2007年、米国では2009年に禁止された。



■ 世界のBSE発件数の推移



	1992	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	累計
全体	37,316	2,215	2,179	1,389	878	561	329	179	125	70	45	29	12	190,634
欧州全体 (英国除く)	36	1,010	1,032	772	529	327	199	106	83	56	33	21	9	5,954
(フランス)	(0)	(274)	(239)	(137)	(54)	(31)	(8)	(9)	(8)	(10)	(5)	(3)	(1)	(1,021)
(オランダ)	(0)	(20)	(24)	(19)	(6)	(3)	(2)	(2)	(1)	(0)	(2)	(1)	(0)	(88)
(デンマーク)	(2)	(6)	(3)	(2)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(16)
英国	37,280	1,202	1,144	611	343	225	114	67	37	12	11	7	1	184,619
アメリカ	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3
カナダ	0	0	0	2 ^(注1)	1	1	5	3	4	1	1	1	0	20 ^(注2)
日本	0	3	2	4	5	7	10	3	1	1	0	0	0	36
イスラエル	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ブラジル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

(注1) うち1頭はアメリカで確認されたもの。

(注2) カナダの累計数は、輸入牛による発生1頭、米国での最初の確認事例(2003年12月)1頭を含む。



■ 牛海綿状脳症(BSE)対策の再評価について

- 国内外での飼料規制等の対策の結果、BSEの発生数は大きく減少し、リスクが低減
 - ～世界では、約3万7千頭（1992年、発生のピーク）→29頭（2011年）
 - ～国内では、平成15年（2003年）以降に出生した牛からは、BSE陽性牛は、確認されていない



平成13年10月の対策開始から10年が経過したことから、最新の科学的知見に基づき、国内検査体制、輸入条件といった対策全般の再評価を行うこととし、平成23年12月19日、食品安全委員会に諮問した。



■ 食品安全委員会への食品健康影響評価の諮問(平成23年12月19日)

1 国内措置

- (1) 検査対象月齢
現行の規制閾値である「20か月齢」から「30か月齢」とした場合のリスクを比較。
- (2) SRMの範囲
頭部（扁桃を除く。）、せき髄及びせき柱について、現行の「全月齢」から「30か月齢超」に変更した場合のリスクを比較。

2 国境措置（米国、カナダ、フランス及びオランダ）

- (1) 月齢制限
現行の規制閾値である「20か月齢」から「30か月齢」とした場合のリスクを比較。
- (2) SRMの範囲
頭部（扁桃を除く。）、せき髄及びせき柱について、現行の「全月齢」から「30か月齢超」に変更した場合のリスクを比較。
※ フランス及びオランダについては、現行の「輸入禁止」から「30か月齢」とした場合のリスクを比較。

3 上記1及び2を終えた後、国際的な基準を踏まえ、さらに月齢の規制閾値（上記1（1）及び2（1））を引き上げた場合のリスクを評価。



食品健康影響評価の概要



■ 食品安全委員会における検討① ～飼料規制と牛における感染状況～

- ・BSE感染牛は、2004年9月以降の出生牛では確認されていない。
- ・飼料規制強化後の出生牛では極めて少なく、強化後しばらくの出生牛のみ



飼料規制が有効と考えられている

各国の出生年別BSE牛摘発状況

出生年	1992	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
日本	2				1	12			4	13	3	1									
アメリカ	1				1	*1				1											
カナダ			1		1	2	2		3	3	3	1	2								
フランス	24	107	281	369	103	47	18	12	5	2			1								
オランダ	4	4	7	7	33	14	6	3	4	1											


* 米国で確認されたカナダからの輸入牛

(注) 米国の1～3例目は、確認時のおおよその年齢から最若齢だった場合を推測



■ 食品安全委員会における検討② ～牛の感染実験～

- 野外でのBSE感染牛が平均的に摂取したであろうBSEプリオンの量は、英国のBSE感染牛の脳幹100mg～1g相当と推定
- BSE感染牛の脳幹1gを経口投与された牛の脳に、異常プリオンたん白質は42か月目(46か月齢相当以上)までは不検出。



実験結果によると、万が一、飼料にBSEプリオンが混ざっていたとしても、42か月間は牛の中枢神経にBSEプリオンは検出されない。

- 日本で確認された21か月齢のBSE陽性牛は、BSEプリオンの蓄積が他のBSE感染牛の1000分の1と少なく、感染性は認められなかった。人への感染性は無視できると判断。



■ 食品安全委員会における検討③ ～その他～

ほとんどの非定型BSEは、8才以上の高齢牛にみられる。

- 日本で確認された23か月齢の非定型BSE陽性牛は、BSEプリオンの蓄積が他のBSE感染牛の1000分の1と少なく、感染性は認められなかった。人への感染性は無視できると判断。

BSEプリオンへの人の感受性は、種間バリアにより、牛より低いと判断。

英国で、1989年に脳、せき髄等の食品への使用を禁止した後、1990年以降の出生者にvCJD患者は確認されていない。

- ※ vCJD: BSEに罹患した牛の脳などの特定危険部位を食べることにより感染。全世界でこれまでに227名が発症し、うち176名が英国人。



■ 食品安全委員会からの答申（平成24年10月22日）

【国内措置】 日本

- ・ 検査対象月齢: 規制閾値が「20か月齢」の場合と「30か月齢」の場合のリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。
- ・ SRMの範囲: 「全月齢」の場合と「30か月齢超」の場合のリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。

【国境措置】 米国、カナダ、フランス、オランダ

- ・ 月齢制限: 規制閾値が「20か月齢」(フランス・オランダは「輸入禁止」)の場合と「30か月齢」の場合のリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。
- ・ SRMの範囲: 「全月齢」(フランス・オランダは「輸入禁止」)の場合と「30か月齢超」の場合のリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる。




食品健康影響評価を踏まえた対応

・・・国内措置・・・



■ 国内措置の見直し ① ～検査対象・SRMの除去の対象～



15

■ 国内措置の見直し ② ～分別管理～

新たに、30か月齢以下の牛に限って、
頭部（扁桃以外）・せき髄・せき柱が利用可能になるため、
30か月齢超と、30か月齢以下の牛を分別することが必要

「SRMの管理及びBSE検査に係る分別管理
ガイドライン」を通知

- BSE検査対象となる牛の分別管理について規定
- 30か月齢以下の頭部（扁桃除く）、せき髄及びせき柱を食用に供する場合の分別管理や汚染防止規定を追加
など



■ 日本のSRMの管理及びBSE検査に係る分別管理

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレサ法」という。)の牛個体識別台帳に基づき月齢を確認。
(と畜検査申請書への月齢及び個体識別番号の記載)



耳標



と畜検査申請書

年 月 日

(あて先)
●●●知事


申請者 住所
氏名


年 月 日生

法人の場合は、その名称
および代表者の氏名


下記の獣畜のとさつまたは解体について、と畜場法第14条の規定による検査を受けたいので申請します。

と殺または解体をしようとする年月日				年 月 日	
性別	品 種	月 齢	出生の年月日	産 地	個体識別番号





19




20



と畜場

せき髄除去・背割り
(30か月齢超処理時)


せき髄吸引




せき髄

背割り



硬膜除去




- SRMは周囲を汚染しないように除去し、専用容器に保管。と畜検査員の確認を受けて、確実に焼却
- せき髄片が飛散しないよう、洗浄水をかけながら背割り


21

と畜場

枝肉検査





枝肉識別ラベル



- 枝肉にせき髄が付着していないことをと畜検査員が確認

枝肉冷却・保管






- BSE検査中の枝肉は、専用区画に保管（専用区画が困難な場合はタグ等による識別）。いずれの場合も、枝肉同士の接触は避けることが望ましい。
- 枝肉出荷時は、牛トシサ法に基づき、個体識別番号の表示等を行う。

22

食肉処理業、食肉販売業、せき柱加工業者等

せき柱処理

個体識別番号等を添付



1. せき柱除去
 - 30か月齢以下の牛に由来するせき柱の処理は、作業場所を分別（それ以外の方法で分別して行う場合は、交差汚染を防止）
 - せき柱除去時には、個体識別番号により月齢を確認
2. せき柱等の出入荷
 - せき柱等の出入荷には、30か月齢以下の牛に由来することが確認できる荷送状等を添付（業者間取引時も同様）
 - 出入荷の記録は3年間保存
 - せき柱を含む部分肉出荷時は、牛トレサ法に基づき、個体識別番号の表示等を行う
3. せき柱等の販売
 - 30か月齢以下の牛に由来することが確認できないせき柱等は消費者に販売しない

23

食品健康影響評価を踏まえた対応

…輸入措置…



■ 輸出国政府との協議内容

輸出国における、SRMの除去や、
30か月齢超・30か月齢以下の牛の区分管理が
重要



- ・輸出国政府との協議と、現地調査を実施
と畜場、食肉処理施設におけるSRM除去、月齢による
区分管理の確認を行った。

※今回輸入の対象となる4カ国では、従前から、月齢30か月を境目にした区
分管理が行われている。

※米国からは、一定期間経過後、米国の遵守状況を踏まえた検疫措置等の
見直し及びBSE対策に関する措置の継続協議の要望を受けている。



■ 輸入措置の見直し

従来

<輸入対象>

<アメリカ、カナダ>
20か月齢以下
フランス、オランダは不可



見直し後

<アメリカ、カナダ、
フランス>
30か月齢以下

<オランダ>
12か月齢以下

30か月齢以下
は輸入可能に
(オランダは12か
月齢以下)

フランス・オランダ
からも輸入可能に

<SRMの除去の対象>

**頭部、せき髄、
せき柱、回腸遠位部**



回腸遠位部、扁桃

頭部(扁桃以外)、
せき髄、せき柱は
輸入可能に

- ・輸出国政府との間で、輸入条件を設定後に、通知を発出



北米のと畜場・食肉処理施設における SRM除去・月齢による区分管理

<ポイント>

- 30か月齢以上と30か月齢未満の牛を区分管理して処理していること
 - ・歯列による月齢の確認
 - ・30か月齢以上の牛へのマーキング、専用の器具の使用 等
- SRMを除去していること
 - 扁桃、回腸遠位部、せき髄、せき柱の除去




生体受入

・ロット単位での搬入・収容



耳標



Cattle Receiving Age Verification Log					
Date		Place			
Lot	Head Count	ID Verified (y/n)	Supplier	Approved (y/n)	By (Print/Sign)



・生産記録による月齢証明牛の確認、区分（限定的）

・生体検査の実施（歩行困難牛のとさつ禁止）

放血



歯列の確認
(30か月齢以上か判定)

※永久歯の第2切歯（3本目の切歯）が確認できれば、30か月齢以上と判断する。




30か月齢未満



30か月齢以上（矢印は永久歯の第2切歯）

剥皮




30か月齢以上のとたいには「30」等の判別スタンプを押印

頭部除去

頭部検査

舌

ほほ肉



扁桃除去

内臓摘出

内臓検査

肝臓

心臓


胃

小腸

大腸

回腸遠位部除去

30か月齢以上は
マーキング



背割り

- 背割り鋸は温湯で洗浄
- 30か月齢以上の処理には専用の色分けした器具を使用



ナイフ

せき髄除去



バキューム




枝肉検査

- せき髄が十分除去されているか確認

31

枝肉識別



- タグによる枝肉の識別管理

洗浄



30か月齢以上のせき柱を染色

冷却・保管



30か月齢以上の枝肉は専用レーンに保管

32

グレードチェンジの手法を利用した月齢による区分管理
～30か月齢以上の枝肉はその日のシフトの一番最後に処理～

部分肉処理



せき柱の除去



せき柱とそれ以外を仕分け
→ベルトコンベアーで搬出

包装・表示

ラベルの保管(鍵付き)



ラベル保管庫の扉 保管庫の中

責任者がラベルと中身が合致しているか確認してから梱包



輸出向け、月齢区分等により製品コードを分類している

保管・出荷



■ 特定危険部位（SRM）の除去

食品安全対策として、特定危険部位（SRM）の除去が行われている。







	日本  改正	米国 	カナダ 	フランス 	オランダ 	OIE基準  (管理されたリスク国)
頭部	30か月齢超の頭部 舌・頬肉を除く	30か月齢超の頭蓋 (注)	30か月齢超の頭蓋	12か月齢超の頭蓋	30か月齢超の頭蓋	
扁桃	全月齢	全月齢	30か月齢超	全月齢	全月齢	
せき髄	30か月齢超	30か月齢超	30か月齢超	12か月齢超	30か月齢超	
せき柱 背根神経節を含む	30か月齢超	30か月齢超	30か月齢超	30か月齢超	30か月齢超	
腸	全月齢の回腸遠位部	全月齢の回腸遠位部	全月齢の回腸遠位部	全月齢の腸	全月齢の回腸遠位部	

(注) 頭部の骨格、脳、眼などを含む部位のこと



■ BSE検査

発生状況の把握などのため、各国でBSE検査が行われている。

	日本  改正	米国 	カナダ 	フランス 	オランダ 	OIE基準 
食肉検査	30か月齢超	-	-	72ヶ月齢超 (注3)	-(注4)	
発生状況調査 (注1) (高リスク牛 (注2))	24か月齢以上の死亡牛等	30か月齢以上の高リスク牛の一部	30か月齢超の高リスク牛の一部	48か月齢超の高リスク牛	30か月齢以上の高リスク牛の一部	

(注1) BSEの発生状況やその推移などを継続的に調査・監視すること

(注2) 中枢神経症状牛、死亡牛、歩行困難牛などのこと

(注3) 欧州委員会は、本年2月下旬～3月上旬以降、加盟国（ブルガリア及びルーマニアを除く）の判断により健康牛のBSE検査を廃止することが可能としている。

(注4) OIE基準では、BSEスクリーニング検査の実施を求めている。



■ 各国の対日輸出条件

		米 国 	カナダ 	フランス 	オランダ 
輸入対象		30か月齢以下の牛肉及び内臓			12か月齢以下の牛肉及び内臓
SRMの除去の対象	扁桃	全月齢			全月齢
	腸	全月齢の回腸遠位部			全月齢の回腸遠位部



■ スケジュール

- 2月1日 国内措置見直しの省令改正（検査対象30か月齢超、SRM見直し）、せき柱に係る告示改正・施行、輸入条件見直しの通知改正・施行
- 4月1日 国内措置見直しの省令施行

※国産牛の検査費用の補助(21か月齢以上)については、本年4月の段階では継続することとし、食品安全委員会の2次答申の際に見直し。



参考資料



■牛海綿状脳症(BSE:Bovine Spongiform Encephalopathy)

1. 原因(病原体)

異常プリオンたん白質(たん白質の一種)

2. 感受性動物

牛、水牛

3. 症状

長い潜伏期間(3~7年程度)の後、行動異常、運動失調などの神経症状を呈し発病後2週間から6ヶ月の経過で死に至る。脳の組織にスポンジ状の変化を起こす。治療法はない。

4. 診断法

脳から異常プリオンたん白質を検出することにより診断。生前診断法はない。

5. 感染経路


BSE感染牛を原料とした肉骨粉(注)を飼料として牛に給与することにより、感染が拡大。
→ BSE発生防止には飼料規制が重要。

(注)肉骨粉とは、食肉処理の過程で得られる肉、皮、骨等の残さから製造される飼料原料。BSE感染牛の特定危険部位が混入する可能性あり。

6. ヒトへの感染

変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)は、BSEの異常プリオンたん白質の摂取が原因と考えられている。平成24年(2012年)10月までに、vCJD患者数は世界全体で227人(うち英国176人(輸血による感染例3人を含む。))。

Photo: BSE罹患牛の延髄(脳の一部)



(x200)


神経細胞及び周囲の神経網に空胞が見られる。

〔出典：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所HP〕



■ 国産牛のBSE対策の概要

● 飼料規制などの生産段階からと畜、販売の各段階における規制により、食肉の安全性を確保



<トレーサビリティ（農林水産省所管トレーサビリティ法）（注）>

（注） 個体識別番号により、その牛が、いつどこで生まれ、飼育され、と畜されたかなどが確認できる。



Ministry of Health, Labour and Welfare

41

■ BSE検査頭数(と畜場)とBSE感染確認頭数

	BSE検査頭数 (と畜場)	BSE確認頭数 ^(注) (平成24年(2012年)12月31日現在)	確認時の月齢				
			<21	21-40	41-60	61-80	>80
平成13年度(2001)	523,591	3(2)				3(2)	
平成14年度(2002)	1,253,811	4(4)				2(2)	2(2)
平成15年度(2003)	1,252,630	4(3)		2(2)			2(1)
平成16年度(2004)	1,265,620	5(3)			1	1(1)	3(2)
平成17年度(2005)	1,232,252	8(5)			2(1)	4(2)	2(2)
平成18年度(2006)	1,218,285	8(3)				7(2)	1(1)
平成19年度(2007)	1,228,256	3(1)					3(1)
平成20年度(2008)	1,241,752	1					1
平成21年度(2009)	1,232,496	0					
平成22年度(2010)	1,216,519	0					
平成23年度(2011)	1,187,040	0					
平成24年4月~12月(2012)	921,029	0					
合計	13,773,281	36(21)		2(2)	3(1)	17(9)	14(9)

(注) () はと畜場で確認された頭数。平成13年(2001年)9月に千葉県で確認された1例目、死亡牛検査で確認された14例を含め、国内ではこれまでに36頭がBSE感染牛として確認

(注) 平成21年度(2009年度)以降は、BSE感染牛は確認されていない。




Ministry of Health, Labour and Welfare

42


■ 国内のBSE検査陽性牛の出生年分布

- 飼料規制等の国内対策の結果、平成15年（2003年）以降に出生した牛からはBSE陽性牛は、確認されていない。



■ 国内のBSE検査陽性牛の発症月齢分布

- 一般的に、BSEは、高月齢で発症する。



(注) 30ヶ月齢以下で感染が確認された2頭については、高い感度を示すマウスを用いた感染実験において感染性は確認できなかった。
(厚生労働科学研究食品の安心・安全確保推進研究事業「食品を介するBSEリスクの解明等に関する研究」)



世界のBSE発生頭数及びvCJD患者数

世界のBSE発生頭数及びvCJD患者数 (BSE:頭、vCJD:人)

	国名	BSE	vCJD
(1)	英国	184,619	176**2
(2)	アイルランド	1,852	4**3
(3)	ポルトガル	1,080	2
(4)	フランス	1,020	27**4
(5)	スペイン	779	5
(6)	スイス	467	—
(7)	ドイツ	419	—
(8)	イタリア	144	2
(9)	ベルギー	133	—
(10)	オランダ	88	3
(11)	ポーランド	73	—
(12)	日本	36	1**5
(13)	チェコ	30	—
(14)	スロバキア	25	—
(15)	デンマーク	16	—
(16)	カナダ	20	2**6
(17)	スロベニア	8	—
(18)	オーストリア	8	—
(19)	ルクセンブルグ	3	—
(19)	アメリカ	3**1	3**6
(21)	リヒテンシュタイン	2	—
(22)	フィンランド	1	—
(22)	ギリシャ	1	—
(22)	イスラエル	1	—
(22)	スウェーデン	1	—
	サウジアラビア		1
	台湾		1

◆ 飼料規制等のBSE対策の結果、各国のBSE発生頭数は近年、急激に減少(約3万7千頭(1992年、発生のピーク)→29頭(2011年))。

(出典)

- BSE発生頭数については、OIE(国際獣疫事務局)(2012年6月30日時点、なお英国のデータは2012年7月6日時点)、日本については2012年8月時点。
- vCJD患者数については、英国保健省(2012年8月時点)等(日本のデータは2012年7月時点)
- なお、表中の“—”は、vCJDの報告がないことを示す。

※1 OIEの統計によると、2003年12月に報告された米国での発生例はカナダから輸入された牛であるため、カナダの発生頭数にカウントされている。

※2 うち3名は輸血による感染例

※3 うち1名は英国滞在歴のある患者。

※4 うち1名は英国に定期的に滞在。


※5 英国滞在歴のある患者。

※6 うち2名は在米英国人、1例は在米サウジアラビア人。



世界のBSE発生頭数及びvCJD発生者数

頭数



サーベイランスは1990年5月から開始

※2012年6月28日時点で生存している

資料: OIE¹⁾ Number of reported cases of bovine spongiform encephalopathy (BSE) in farmed cattle worldwide: 2012/11/8
vCJD数 vCJD cases Worldwide (EUROCDJ): 2012/6/28



■ OIE(国際獣疫事務局)におけるBSEステータスの分類と貿易条件

ステータス	貿易条件
無視できるリスクの国 (注1) オーストラリア、ニュージーランド、 デンマーク等19ヶ国	① とさつ前後検査に合格 ② 飼料規制が施行された日以降に出生した牛由来であること
管理されたリスクの国 日本(注2)、米國、カナダ、フランス、 オランダ等30ヶ国	① とさつ前後検査に合格 ② ピッシング等が行われていないこと ③ 特定危険部位(SRM)が除去されていること SRMの範囲：全月齡の扁桃・回腸遠位部、30ヶ月齡超の 脳・眼・せき髄・頭蓋骨・せき柱
不明のリスクの国	① とさつ前後検査に合格 ② ピッシング等が行われていないこと ③ 特定危険部位(SRM)が除去されていること SRMの範囲：全月齡の扁桃・回腸遠位部、12ヶ月齡超の 脳・眼・せき髄・頭蓋骨・せき柱


(注1) 「無視できるリスクの国」の要件は、最も遅く産まれたBSE牛の生後11年が経過していること等
 (注2) 平成25年(2013年)2月、日本は「無視できるリスクの国」の要件を満たす見通し




■ 牛せき柱に関する規制について

- せき柱(背骨)の、骨自体には、BSEプリオンは蓄積しない。
- 背根神経節**には、BSEプリオンが蓄積されることがわかっている。
- 背根神経節は、通常の処理では、せき柱の骨の部分と完全に分離できないため、**背根神経節を含む、せき柱を規制している。**

せき柱の部位



せき柱の横断面



※ せき髄はと畜場において処理



■ 牛せき柱に関する規制の見直し内容の詳細

<見直し内容>

① せき柱の食品等への使用

安全性を確認した国で飼養された、30月齢以下の牛由来のせき柱は、食品等への使用が認められることとする。

- 30月齢以下： ・ Tボーンステーキとしての提供が可能。
・ エキス、骨油、ゼラチン等の原材料として使用が可能。
- 30月齢超： 引き続き、食品等への使用は不可。

適切な分別管理が必要

② せき柱の範囲を変更

骨の突起部分の一部は、リスクにはならないことから、規制の対象外としている。

除去する際の現場の負担軽減のため、規制の対象外とする突起部分の範囲を拡大する

